

Болезнь, вызванная вирусом ЭБОЛА



Болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ) – острое вирусное высококонтагиозное инфекционное заболевание.

Естественными хозяевами вируса Эбола в природе являются плодовые летучие мыши. Инфицироваться также могут шимпанзе, гориллы, другие приматы, лесные антилопы и дикобразы, которые обитают в



тропических лесах.

Инкубационный период при БВВЭ (с момента инфицирования до появления первых клинических признаков) составляет от 2 до 21 дня.

Заболевание начинается остро с лихорадки, сильной слабости, головной боли, болей в горле, мышцах. Позднее появляется сухой кашель и боли в грудной клетке, диарея, рвота, развиваются признаки обезвоживания, острая почечная недостаточность. Характерным является быстрая генерализация инфекции с развитием общей интоксикации и массивных кровотечений.

Заражение человека происходит при тесном контакте с кровью, выделениями, органами или физиологическими жидкостями, трупами инфицированных животных, а также при их разделке, приготовлении или употреблении в пищу. Входными воротами инфекции являются слизистые оболочки глаз, носа, рта, дыхательные пути и микротравмы кожи. Не исключены аэрогенный и половой пути инфицирования.



Эпидемиологическая ситуация

Крупнейшая вспышка БВВЭ произошла в трех странах Западной Африки (Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне) в период с 2014 по 2016 годы, когда было зарегистрировано более 28 тыс. случаев заболевания и 11 тыс. летальных исходов.



16 мая 2026 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Первые случаи заболевания были зарегистрированы в эпицентре нынешней вспышки Эболы — провинции Итури Демократической Республики Конго (ДРК), которая граничит с Южным Суданом и Угандой.

15 мая 2026 года Министерство здравоохранения Уганды подтвердило вспышку заболевания после регистрации завозного случая из ДРК.

В настоящее время сообщено о более 800 лабораторно подтвержденных случаях, из которых более 200 закончились смертельным исходом.

Рекомендации ВОЗ в отношении поездок в страны, в которых регистрируются случаи БВВЭ

- В целях предупреждения заражения лихорадкой Эбола гражданам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездки в страны Центральной и Западной Африки